

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)

C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

ABONNEMENT ANNUEL

12 NF

Supplément N° 3 au Bulletin Technique N° 6 de mars 1961

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

Hoplocampe des Prunes : En raison de l'évolution précoce des Pruniers, la sortie des adultes n'a pas coïncidé avec la pleine floraison. Aussi, le pourcentage des pontes observées cette année est très faible.

D'autre part, l'ensemble des Pruniers présente une floraison extrêmement abondante. Les dégâts que nous prévoyons seront pratiquement peu importants.

Néanmoins, un traitement insecticide pourra être effectué du 27 au 31 mars avec l'un des produits suivants :

- H.C.H., Parathions ou mieux Oléoparathion, ou Oléomalathion valables contre d'autres parasites (Chenilles défoliatrices, Araignées rouges, Pucerons etc...).

Hoplocampe des Poiries : Les sorties d'insectes ont été importantes dans plusieurs vergers et les pontes sont parfois nombreuses.

Dans les vergers habituellement envahis, un traitement devrait donc être appliqué dès réception de cette note avec l'un des produits déjà indiqué pour l'Hoplocampe des Prunes.

Bien mouiller les organes floraux dont les pétales tombent déjà en raison de l'avance de végétation.

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Les risques de contaminations signalés dans notre précédent avis persistent. Aussi, nous conseillons d'incorporer un fongicide au traitement insecticide préconisé sur les Poiriers et de traiter également les Pommiers.

INFORMATIONS

Tavelure du Pêcher : Nos essais des deux dernières années nous ont montré l'intérêt d'un traitement à la chute des pétales. Sur les variétés où cette maladie est à redouter, on pourra appliquer une spécialité à base de Captane, de Thirame, de Zirame, ou bien du Soufre.

.../...

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Black-Rot : Sur les grains de raisin qui n'ont pas été enfouis par un chaussage, les périthèces sont à maturité depuis plusieurs jours déjà. Des contaminations sont donc possibles aux prochaines pluies importantes.

Dans les vignes suffisamment débouurrées, situées à proximité des parcelles abandonnées, il serait utile de prévoir un premier traitement avec l'une des spécialités habituellement utilisées contre le Mildiou.

INFORMATIONS

Oïdium : Dans le vignoble des coteaux des Basses-Pyrénées où la vigne est très développée on préviendra l'apparition des premiers foyers d'Oïdium par l'application d'un Soufre.

Erinose : Contre cet Acarien qui provoque la formation de boursouflures à la face supérieure des feuilles, on conseille d'effectuer un Soufrage par beau temps.

Bordeaux, le 24 mars 1961

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU